Rufast 75 EW

روفاست

Matière active : Acrinathrine
Formulation : Emulsion aqueuse
APVN ° : 04 24 110

المادة الفعالة اكريناترين
الصياغة محلول سائل مائي
رقم رخصة البيع 0424110

Ravageurs et doses

Cultures	Ravageurs	Doses	DAR
Cultures maraîchères	Acariens et thrips	0.8-1l/ha	3 j
Arbres fruitiers	Acariens thrips	0.6-1l/ha 0.4l/ha	21j
Vigne	Acariens	0.04à0.06l/ha	21j
Agrumes	Acariens	0.06à 0.08 l/ha	30j

مقادير الاستعمال

زراعة	متلف	مقادير	فترة الامان
الخضروات	العناكب و التريبس	0.8-1ل/هكتار	3
أشجار الفاكهة	العناكب التريبس	0.6-1ل/هكتار 0.4ل/هكتار	21
الكروم	العناكب	0.04-0.06 ل/هكتار	21
الحمضيات	العناكب	0.06-0.08 ل/هكتار	30

Performances :

Rufast est un insecticide –acaricide ayant une grande efficacité sur les acariens jaunes et rouge de la vigne, des cultures maraîchères et des arbres fruitiers
Rufast possède des propriétés insecticides sur des cibles particulières telles que les cicadelles et les thrips.

Propriété et mode d'emploi

Rufast agit essentiellement par contact
Son action acaricides s'exerce sur l'ensemble des formes mobiles : larve et adulte .
Rufast se caractérise par deux propriété complémentaires :
-Action de choc
-Persistance d'action
Outre le retard de manifestation permis par l'action de choc,on observe une activité résiduelles sur d'éventuelles recolonisations ainsi que sur la descendance des adultes suivant

Préconisations

1-Arbrocultures fruitiers

* Contre les acariens du pommiers et du poirier (d'autre arbres fruitiers à pépins)
L'intervention optimales fera sur des seuils de population de l'ordre de 3 formes mobiles par feuille à, la dose de 0.06à 1l/ha
Rufast respecte les acariens prédateurs tels que ***Neoseiulus calfornicus***
*Le délai d'utilisation avant récolte est de 21jours
*Sur thrips des pêches et des nectarines, intervenir avec Rufast dès la détection des premiers thrips à la dose de 0.4l/ha
* le délai d'utilisation avant récolte est de 7jours

2-Vigne :

Contre les acariens
Rufast s'applique en traitement de printemps ou sur seuil de 2-3 formes mobiles par feuilles à la dose de 0.04-0.06 l/ha selon les vignobles
Sur cicadelles, suivre les avertissements de la protection des végétaux.
Le délai d'utilisation avant récolte est de 21jours

3-Cultures maraîchères

Rufast présente une remarquable efficacité sur thrips et plus particulièrement sur thrips ***Franklirielle occidentalis***
Rufast s'applique dans un programme out s'alternent les familles chimiques à la dose de 0.8à 1l/ha
L'intervention aura lieu dès l'apparition des premiers thrips

Sélectivité

Rufast est parfaitement sélectif de la vigne ,des arbres fruitiers et à noyau ainsi que des culture s maraîchères

Mode d'application :

Rufast est un concentré émulsionnable ,dont la dilution dans l'eau est aisée.
Rufast s'ajoute dans la cuve du pulvérisateur, en cour de remplissage
La pulvérisation est un facteur de réussite des application s Rufast , il est donc nécessaire que le volume de bouillie ,la pression de traitement et la vitesse d'avancement soient correctement réglés pour assurer une couverture régulière de l'ensemble du feuillage cible
Il est recommandé d'intervenir sur végétation sèche

الكفاءات

روفاست مبيد حشري عنكبوتي دو فعالية كبيرة على العناكب الصفراء و الحمراء للكروم أشجار الفاكهة الحمضيات و الخضر
يحتوي روفاست على خاصيات حشرية ضد السكادال و التريبس

خاصية و طريقة التاثير

يؤثر روفاست بالملامسة
تأثيره العنكبوتي يطبق على جميع المراحل المتحركة اليرقات و البالغ
يتميز روفاست بخاصيتين مكملتين
تأثير صدام
-استمرارية التأثير
بالإضافة إلى المظاهر الناتجة عن تأثير الصدام نلاحظ نشاط متبقي على استعمارات أخرى و الأجيال ألاحقة أيضا

احتياطات

1-أشجار الفاكهة

ضد عناكب الأشجار التفاح و الأجاص (ذات البدرة) التدخل الأحسن يكون على حد 3 أشكال متحركة للورقة بمقدار 0.06-1لتر في الهكتار
روفاست يحافظ على العناكب النافعة مثل النووزيلوس كاليفورنينيكيس
مدة قبل الجني 21يوم
ضد التريبس في أشجار الخوخ و النكتارين يستعمل روفاست عند ظهور أول تريبس بمقدار 0.4 لتر / هكتار
مدة قبل الجني 7يوم

2--الكروم

ضد العناكب يستعمل روفاست للعلاج في فصل الربيع أو على حد 2-3 أشكال متحركة للورقة بمقدار 0.04-0.06 لتر في الهكتار حسب الكروم
على السيكادال يجب إتباع إرشادات حماية النباتات
مدة قبل الجني 21 يوم

3- الخضروات

روفاست دو فعالية جيدة على التريبس و بالخصوص التريبس فرانكليريلا اوكسيدونتاليس
يطبق روفاست في برنامج أين تتبادل العائلات الكيميائية بمقدار 0.8-1 لتر في الهكتار
التدخل يكون عند ظهور التريبس الأول

اختيارية

روفاست اختياري جيد للكروم أشجار الفاكهة ذات النواة و ذات البدور و الخضروات

طريقة الاستعمال

روفاست سهل الذوبان في الماء
يملئ نصف الرشاش بالماء ثم تضاف كمية روفاست المنصوح بها بعدها نكمل ملا الرشاش بالماء
عملية الرش عامل مهم في نجاح مكافح ضد الحشرات ولهذا لابد أن تكون كمية الماء في الرشاش ضغطه و سرعته مدروسة لكي نحصل على التغطية الكاملة لكل أوراق النبات بالمبيد
ينصح استعمال روفاست على الأوراق غير المبللة

Distributeur exclusif **: CASAP**
06 RUE ALLAOUA AEK
KOUBA ALGER
Tel. : 021 29 03 43 – 021 28 30 20
Fax. : 021 46 22 80
Email : casap _ alger 2001@yahoo.fr

Bayer Crop Science